son disque un chevron surélevé à pointe prolongée en arrière jusqu'au sommet en forme de carène.

Élytres subdéprimées, d'un noir très mat et presque imponctué dans leurs deux tiers postérieurs ; parées à leur base d'une grande tache nébuleuse, peu tranchée, d'un roux brunâtre, occupant toute l'endocorie, la base de la mésocorie et de l'exocorie : celle-ci offrant vers son dernier tiers une tache rousse, peu distincte, ne touchant pas au bord latéral : la mésocorie sérialement ponctuée à sa base, le clavus dans toute sa longueur. Membrane plus ou moins enfumée avec une tache pâle derrière le sommet des exocories.

Dessous du corps noir. Poitrine rugueusement ponctuée. Ventre convexe, très éparsement pubescent, brillant, presque lisse.

Pieds d'un roux testacé parfois assez foncé, avec les cuisses noires, moins les genoux. Tibias antérieurs assez fortement recourbés en dedans.

Patrie. Collioure ; Vienne (Autriche), Dalmatie (Coll. *Puton*).

Obs. Cet insecte qu'on prendrait d'abord pour une variété de *Notochilus contractus* H.-S., en diffère par une taille moindre, par une couleur généralement plus obscure et plus mate, avec la tache basilaire des élytres plus nébuleuse et peu tranchée, la membrane encore plus enfumée et l'exocorie moins ponctuée, à tache latérale postérieure presque indistincte et non liée au rebord lui-même. Le prothorax est un peu plus court, moins rétréci en avant, plus densément et plus rugueusement ponctué, à sillons un peu moins forts. Les antennes paraissent un peu moins longues, etc.

HÉMIPTÈRES NOUVEAUX OU PEU CONNUS

ET

NOTES DIVERSES

Par le Dr A. PUTON.

Geocoris chloroticus Put.

D'un testacé très pâle, opaque sur le pronotum et l'écusson, plus brillant sur les élytres. Tête avec les sillons du clypeus bruns ainsi que une petite tache au bord postérieur du vertex ; ocelles très rapprochés des yeux ; ceux-ci moins saillants que dans le *siculus* ne débordent pas les angles latéraux postérieurs du pronotum ; vertex

imperceptiblement pointillé ; antennes d'un jaune roux, le deuxième article assez épais, à poils noirs, courts, raides, spinosules. Pronotum beaucoup plus large que long (bien plus court que dans le *siculus*); sa surface, peu convexe, est couverte d'une ponctuation très fine et les intervalles encore plus finement et imperceptiblement pointillés, de sorte qu'elle est opaque, excepté sur les callosités antérieures, qui forment une bande mince, peu saillante, et sur une petite place de chaque côté du bord postérieur un peu en dedans de l'angle postérieur. Ligne médiane légèrement et finement élevée; une petite tache brune un peu après le bord antérieur sur cette ligne entre les callosités. Écusson avec une tache brune triangulaire au milieu de sa base, sa surface à ponctuation fine, serrée et double comme celle du pronotum et en outre très finement ridée en travers; sa ligne médiane finement carénée. Élytres non élargies après la base, assez brillantes; deux lignes de points très fins au bord clavaire de la corie et entre ces lignes quelques points irréguliers; disque presque lisse ou imperceptiblement pointillé, les points près de l'angle postérieur à peine plus visibles. Membrane hyaline, laissant voir le dos de l'abdomen noir; ventre un peu brunâtre au milieu de sa base; propleures et un peu les mesopleures tachetées de brun. Premier article du tarse postérieur une fois et demie aussi long que les deux suivants réunis. — Long., 3 3/4 mill.

Villa Réal (Portugal méridional); un seul exemplaire découvert par M. le Dr Ch. Martin (Collect. *Marmottan*).

Cet insecte se distingue de tous ses congénères par la ponctuation double et fine du pronotum ; sa couleur le rapproche des *hirticornis* Jak. et *Fedtschenkoi* Reut., dont la ponctuation est différente.

Aphanus pini L. var. **intermedius** Put.

Cet insecte, intermédiaire entre les *A. pini* L. et *phœniceus* Rossi a le bord latéral du pronotum entièrement noir et la couleur plus foncée du *phœniceus* et la base des tibias antérieurs rousse du *pini*. La *costa* est un peu rembrunie et en outre la gouttière du bord externe des élytres a une ligne de points plus nombreux et plus rapprochés que dans ces deux espèces et continuée presque jusqu'à l'extrémité de l'élytre.

Je le rapporte au *pini*, parce que, comme dans cette espèce, la ligne de points intermédiaire du clavus est plus fortement courbée et, au milieu, plus rapprochée du bord scutellaire que du bord sutural. Dans le *phœniceus*, au contraire, cette ligne de points est moins

courbée et, au milieu, plus rapprochée du bord sutural que du bord scutellaire (1).

J'ai trouvé un exemplaire de cette curieuse variété à Batna et la collection Marmottan en renferme un semblable de Mahadid.

Monanthia cucullifera Put.

Cette espèce est si voisine de la *M. capuc*[illegible] Germ., macroptère qu'il suffit d'en indiquer les différences : sa couleur est plus pâle et son réseau, concolore, ne présente qu'une série de points noirs le long de la marge externe des élytres; les antennes sont plus longues et le quatrième article surtout est plus long et plus renflé. Les poils de l'ampoule et des marges du pronotum sont plus longs, plus fins, plus serrés, nullement [illegible]étiformes, mais mous et courbés à l'extrémité ; les carènes et les m[illegible]ges du pronotum sont plus élevées, celles-ci sont moins éva[illegible] relevées plus verticalement; l'ampoule forme un cône plus [illegible] et du double plus élevé. La marge élytrale est beaucoup plu[illegible]e ; les cellules de ses deux rangées, au lieu d'être larges et [illegible]s sont allongées, elliptiques, celles de la rangée externe beaucoup plus grandes que celles de l'interne, qui sont peu apparentes et linéaires. Les cellules du disque des élytres ont plutôt la forme de points-fossettes que de cellules.— Pour le reste comme dans *M. capucina*.

Sarepta, reçue de M. Becker.

Coranus rugosicollis Put.

Assez étroit, noirâtre, varié de flavescent, à longs poils blanchâtres et à duvet grisâtre. Tête allongée, sa partie postoculaire bien plus longue que la portion antéoculaire ; non renflée derrière les yeux et graduellement et longuement rétrécie en arrière; une ligne médiane flavescente sur le vertex et une de chaque côté au bord interne des yeux ; dessous de la tête jaunâtre avec une ligne médiane noire. Antennes roussâtres, le 1er article un peu plus court que la tête, le 2e un peu plus court que la moitié du 1er, le 3e d'un quart plus long que le 2e. Lobe antérieur du pronotum bordé de jaunâtre, le postérieur avec des bandes longitudinales alternativement noires et jaunâtres; ce lobe chargé de grosses rugosités; angles latéraux obtus, très peu saillants. Écusson avec la carène médiane et l'extré-

(1) Ce caractère important m'a été indiqué par mon ami le Dr Horvath.

mité jaunâtre, celle-ci formant un tubercule saillant mais peu relevé. Côtes des cories plus ou moins jaunâtres ; membrane légèrement enfumée ; connexivum entrecoupé de noir et de jaunâtre. Ventre largement flavescent, lisse, une large bande marbrée de brun sur les côtés, et en dedans de celle-ci une autre beaucoup plus étroite. Tibias testacés avec un court anneau brun à la base, fémurs marbrés de brun. — Long., 9 1/2 mill.

Biskra (Collect. *Marmottan* et *Puton*).

Cette espèce par sa petite taille et sa forme étroite se place près du *C. niger* Rb.; elle en diffère, outre la couleur, par le 1er article des antennes un peu plus court, l'angle du pronotum un peu moins saillant, la pointe de l'écusson moins relevée, les rugosités du lobe postérieur du pronotum plus fortes, peu entremêlées de points et analogues à celles de l'*angulatus*, tandis que dans le *niger* il y a une ponctuation très profonde, confluente et par conséquent rugueuse.

Il diffère du *C. tuberculifer* Reut. par sa taille plus faible, les rugosités du pronotum, la pointe de l'écusson moins relevée, le 1er article des antennes plus court, etc.

Obs. Le *C. tuberculifer* Reut. se trouve en France, où il a été confondu avec le *subapterus* Deg. jusqu'à la description de M. Reuter; je le possède de Bouray et de Vallouise et je crois que son habitat, qui est à déterminer, est très étendu.

Termatophylum insigne Reut.

Le mâle de cet insecte qui n'est pas décrit a le vertex plus étroit que la femelle, les ocelles plus distincts. Il est très remarquable par le deuxième article des antennes renflé en massue fusiforme comme chez les *Heterocordylus* et *Atractotomus*.

C'est un caractère qui n'avait pas encore été signalé dans les *Anthocorides* et cet insecte par ses antennes, la grande cellule de la membrane, les poils squamiformes argentés, les callosités du pronotum rentrerait dans les *Capsides*, si la forme de sa tête, ses ocelles et sa forme générale ne convenaient mieux aux *Anthocorides*. C'est l'insecte qui me paraît faire le mieux la transition entre les deux familles.

Euderon Put. nov. gen.

Corps ovale oblong. Tête inclinée ; vertex large et très convexe, clypeus encore plus convexe, gibbeux et séparé du vertex par un

fort sillon transverse; yeux très saillants, ne touchant pas les angles du pronotum. Rostre atteignant les hanches intermédiaires. Antennes longues et robustes; le premier article assez renflé, en cône renversé dépasse le clypeus de la moitié de sa longueur ; le deuxième article dépasse les angles postérieurs du pronotum, il est cylindrique jusque près de son extrémité où il est presque subitement et assez fortement renflé en massue brune ; les deux derniers sont aussi renflés mais moins fortement. Pronotum étroit en avant, très large en arrière, côtés sinués après les callosités et obtusément carénés en arrière; callosités formant deux bossettes arrondies assez élevées; bord postérieur du pronotum prolongé en lamelle inégalement relevée, c'est-à-dire formant devant l'écusson un large repli arrondi et très relevé et un autre de chaque côté à l'angle postérieur, mais moins relevé que devant l'écusson ; il en résulte que le bord postérieur du pronotum, rappelle la collerette ou fraise godronnée de nos grand'mères. Écusson très convexe, sa pointe aiguë, submucronée. Membrane entière mais peu prolongée après les cellules qui sont plus grandes que la partie postcellulaire. Tibias à épines et soies noires. Tarses à soies raides, noires ; ongles longs, légèrement courbés près du sommet seulement ; *arolia* non visibles.

Ce genre de Capsides, du groupe des *Oncotylaria*, est des plus remarquables et ne ressemble à aucun autre par son singulier pronotum et ses antennes à deuxième article en massue.

Euderon Martini Put.

Entièrement d'un beau jaune orangé pâle, opaque, la massue du deuxième article des antennes et les deux derniers d'un brun rouge. Extrêmité du rostre et des tarses noire. Premier article des antennes avec quelques soies noires très courtes; pattes avec des soies analogues devenant plus nombreuses et plus longues graduellement en avançant vers les tarses. Tête et pronotum finement et confusément ponctués ; élytres avec des soies noires très courtes et très clair semées que l'on pourrait prendre pour une ponctuation noire. Membrane blanche, nervures d'un jaune pâle. — Long., 5 mill.

Un seul exemplaire trouvé à Biskra par M. le Dr Ch. Martin et déposé dans la collection du Dr Marmottan.

Orgerius conspersus Put.

Largement ovale, opaque, d'un testacé grisâtre livide, parsemé de points noirs, plus visibles sur le dos de l'abdomen. Vertex aussi long

que le pronotum et l'écusson réunis, en ogive étroite, à sommet légèrement obtus ; carènes médiane et latérale fortes, l'intervalle des carènes excavé. Front droit, vu de profil, chargé de cinq carènes droites, aiguës, parallèles, excepté tout à fait en avant où elles convergent brusquement, les deux marginales situées dans le même plan que les trois médianes ; ces carènes limitent quatre sillons ou vallécules dont les deux internes sont légèrement plus larges que les deux externes. Front et clypeus pâles, sans taches, la base du clypeus avec une trainée nébuleuse de petits points noirs qui se prolonge un peu sur les propleures. Pronotum et écusson avec trois carènes médianes peu aiguës, le pronotum a en outre en dedans de la carène marginale externe une petite carène parallèle à cette dernière. Élytres opaques à réticulation concolore et peu saillante, une côte juxtasuturale et une latérale peu élevées. Pattes antérieures non lamellaires ; tous les fémurs avec des lignes longitudinales noires dans les sillons, les tibias antérieurs noirâtres avec un large anneau jaunâtre un peu après le milieu ; tibias postérieurs jaunâtres ponctués de noir, leur arête externe avec cinq épines noires, dont l'apicale est trifide. — Long., 5 mill.

Batna. Un seul exemplaire dans la collection Marmottan.

Cette espèce a l'aspect du *similis* Och. pour la couleur, mais le *conspersus* a le vertex bien plus étroit et plus long. — Il se rapproche plus des *dimorphus* et *Korolkovi* Och., mais la bande noire des propleures et du vertex est ici à peine indiquée par quelques points noirs ; en outre le *dimorphus* n'a pas les carènes marginales du front situées dans le même plan que les autres et le *Korolkovi*, que je ne connais pas, a les carènes latérales du front sinuées.

Orgerius albofasciatus Put.

Ovale, très large, assez brillant. Tête, pronotum et écusson d'un jaune grisâtre livide. Vertex plus long que le pronotum, étroit, en ogive aiguë, chargé d'une carène médiane et d'une latérale de chaque côté, les intervalles lisses. Front droit, vu de côté, chargé de trois carènes médianes parallèles, enclosant deux lignes noires, les côtés fortement ponctués jusqu'aux carènes marginales. Base du clypeus très convexe, lisse, d'un noir brillant excepté la ligne médiane, moitié apicale du clypeus avec des chevrons noirs. Tempes dentiformes derrière les yeux. Pronotum avec une carène médiane droite et une de chaque côté de celle-ci convergente en avant ; en dehors de ces carènes le pronotum est perforé de gros points extrêmement

profonds. Écusson avec une carène médiane et une autre très peu apparente de chaque côté de celle-ci, ces trois carènes réunies en avant à une carène transverse parallèle au bord antérieur ; angles latéraux de l'écusson en lanière très aiguë ; de chaque côté, en dehors des carènes, une courte ligne de quatre ou cinq gros points comme ceux du pronotum, près du bord postérieur. Élytres brunâtres, presque lisses, à réticulation effacée, à peine visible; une large bande transverse blanche un peu avant le bord postérieur et un peu après la moitié ; une carène longitudinale parallèle à la suture et une autre au bord externe. Dos de l'abdomen d'un gris livide, parsemé de points noirs. Le centre des propleures convexe, noir, très lisse et très brillant comme la base du clypeus. Cuisses et tibias antérieurs élargis en lame tranchante, foliacée, les tibias antérieurs graduellement rétrécis de la base à l'extrémité ; toutes les pattes jaunâtres, marbrées de gros points noirs plus ou moins confluents. Arête externe des tibias postérieurs avec sept épines noires. — Long., 6 1/2 mill.

Algérie, Nemours; un seul exemplaire découvert par M. le Dr Martin (Collect. *Marmottan*).

Cette espèce diffère du *platypus* Fieb. par son front beaucoup plus long et plus étroit, la réticulation de ses élytres très effacée, comme aplatie. Elle ne peut non plus se rapporter à aucune des quatre espèces à pattes antérieures lamellaires décrites par Ochanine.

SYNONYMIE.

Lygæus Saundersi Mls. R. = *festivus* Thbg.

CAPTURES D'HÉMIPTÈRES.

1. *Stibaropus Henkei* Jak. — Bulgarie (coll. *Marmottan*).
2. *Byrsinus fossor* Mls. R. — Id. (*id.*).
3. *Aphanus Walkeri* Saund. — Neum-sur-Mer (Herzegovine), *Dr Hensch*.
4. *Aradus aterrimus* Fieb. — Marly (coll. *Marmottan*).
5. *Allæorhynchus flavipes* Fieb. — Aube (*d'Antessanty*).
6. *Phytocoris albofasciatus* Fieb. — Décines (Isère), coll. *Montandon*.
7. *Phyt. Fieberi* Bol. — Domanovic (Herzegovine), *Dr Heurch*.
8. *Phyt. punctum* Reut. — Égypte (coll. *Fairmaire*).
9. *Calocoris quadripunctatus* Fab. — Aube (*d'Antessanty*).

10. *Corixa selecta* Fieb. — Zieriksee (*D^r Fokker*).
11. *Eurybregma nigrolineata* Scott. — Avignon.
Ce genre paraît trop peu distinct des *Eurysa* pour en être séparé.
12. *Aphalara nebulosa* Zett. — Forêt de Mormal (*Lethierry*).

LISTE D'HÉMIPTÈRES DE PÉKIN

Par J. FALLOU.

Odontoscelis fuliginosa L.
Graphosoma lineatum L.
Coptosoma chinense Sign.
Cydnus nigritulus Sign.
Zicrona illustris A. et S.
Schirus triguttatus Scott.
» *niveimarginatus* Scott.
Picromerus vicinus Sign.
Arma chinensis Fallou.
Palomena rubricornis Scott.
Dolycoris indicus Stål.
Halyomorpha picus F.
Eurydema festivum L. Reut.
» *rugosum* Mots.
Hophitodera binotata F.
Tropicoris Davidi Sign.
» *Armandi* Fallou.
Megalonotus limbatus Klug.
Syromastes marginatus L.
Therapha hyoscyami L.
Elasmolomus sordidus F.
Pyrrhocoris coriaceus Scott.
Mendis fuscipennis Stål.

Tous ces Hémiptères, capturés en même temps que ceux signalés dans cette *Revue* (*supra*, p. 63 et suiv.) par M. Reuter, ont été rapportés de Pékin par notre savant naturaliste, M. l'abbé A. David, qui a bien voulu en enrichir ma collection; je suis heureux de pouvoir lui offrir ici l'hommage de ma reconnaissance.